

3. 口腔靈敏度差

感覺或知覺損傷會破壞語音的規則與學習，也就是當發音時對舌頭部位運用的靈敏度，如此能力不佳時，就會出現如舌尖音的ㄉ去以舌根音的ㄍ取代情形出現。

4. 聽力損失

聽力喪失會對語音的辨識產生困難，如果孩童無法完整的聽到聲音，會影響到它正確的模仿語音，即使能夠聽到某些語音，但通常也是一很模糊的扭曲音，然在無法辨認語音特徵的情形下自然無法正確發出，這將嚴重影響其構音，甚至是語言發展。

常見問題與處置

1. 小孩發音不準，幾歲適合矯正呢？

應考量：

口腔肌肉發展中	發現小朋友發音不清晰時： 2-3 歲 → 可先安排語言治療師評估，排除語言理解與表達發展疑慮 4-5 歲 → 未明顯改善才安排構音矯正
講話的自我覺察能力發展中	
治療的配合度不夠	
年紀太小改善發音的動機低	
對指令的理解領悟力差	

2. 小孩發音不清，請問需要剪舌繫帶嗎？

提升口腔動作協調性	請找語言治療師安排構音矯正改善發音
構音位置	
發音方法	
氣流控制	
語音聽辨能力	
是否剪舌繫帶？	請找語言治療師評估是否需要

3. 2-3 歲小孩發音不標準，被醫院建議回家觀察即可，我回家要怎麼教？

示範正確音給他聽 → 「阿東」，回應說『對，找阿公』	家長可做這些事，為後續構音矯正做準備
提升語言理解力與表達能力 → 增加親子共讀等活動	
玩口腔運動遊戲 → 吹泡泡、吹風車等	

★請注意！請視孩童情況在適當的矯正年齡來介入語言治療的構音矯正。

家長應避免過度擔心及過早矯正(四歲前)除了可能會影響幼童對說話的自信心外,效果也有限。

參考資料：

1. 語言治療資訊讚

~如需轉載本篇文章或有任何疑問，請洽新竹馬偕兒童醫院復健科~

~新竹市立馬偕兒童醫院 關心您的健康~