

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

hcservice@mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2017/11

小兒科部



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

- 一、 通常發生在 3 個月內的新生兒。其反覆、無法解釋的哭鬧。都發生在傍晚，或夜晚一固定時間。多發生在 2-3 個禮拜大的嬰兒。
- 二、 原因不明。推測原因包括胃腸過敏、乳糖不耐、腹脹及吞嚥過多空氣、神經系統尚未成熟、以及家庭氣氛不和睦等。
- 三、 目前並沒有很好診斷方法；在排除其他原因後，就須懷疑此可能。
- 四、 這種現象在 3 到 4 個月大時會自行消失，不需特別治療。
- 五、 對於家長已無法忍受的病例，給予一些抗組織胺、鎮靜劑、抗痙攣劑；不過效果不顯著。
- 六、 局部塗抹驅風油，或是用熱毛巾來敷蓋也可以。
- 七、 由於乳糖吸收不良引起的腹絞痛，可考慮換成無乳糖配方奶。
- 八、 應給照顧寶寶的人支持與休息，保持和睦氣氛，等待症狀消失。
- 九、 當病童出現持續嘔吐、糞便有血、胃口持續下降、發燒、活動力下降、持續腹脹等

異常現象時，務必就醫請醫師評估是否有其他急性胃腸道疾病發生。

新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。