



## 子宮輸卵管攝影檢查

### 衛教資訊

#### 檢查過程說明：

該項檢查需配合月經週期，檢查是將對比劑注入子宮及輸卵管來評估子宮及輸卵管通暢情形，並診斷子宮及輸卵管有無異常。

檢查必須在月經乾淨後 5-7 天內執行。檢查前請先排空膀胱內尿液，換上檢查服。受檢者躺在檢查台上，姿勢與婦科內診相同，婦科醫師會使用擴陰器(鴨嘴)撐開陰道，依序再放單勾及注射器。經由注射器注入少量對比劑後，依照放射師的指示調整姿勢拍攝子宮與輸卵管影像。此時受檢者會覺得下腹像月經來時一樣脹痛或合併腰酸，這是正常現象，不需驚慌。

結束後受檢者請依醫師指定時間開始服用藥物，並按藥袋指示服用。檢查後 2 小時將陰道內紗布取出。極少數患者檢查結束當晚仍持續疼痛或更加惡化情形，請即刻返院就醫，並告知醫師曾施行此項檢查。避免泌尿道感染，請在檢查日開始三天內禁止房事、盆浴、游泳、陰道沖洗等。檢查後 2~3 天會有少量出血屬於正常，若出血量超過經血量或出血天數超出月經期，請即刻返院就醫，並告知醫師曾施行此項檢查名稱。

#### 檢查的禁忌症：

1. 月經延遲且尚未確定懷孕者
2. 子宮外孕
3. 骨盆腔發炎或骨盆腔內有腫瘤
4. 對比劑過敏者

#### 檢查可能發生的併發症：

1. 子宮內膜異位、膿性輸卵管破裂；( 1-2 % ) 機率骨盆腔感染
2. 含碘對比劑時可能感覺噁心、暈眩、嘔吐、打噴涕；具過敏體質患者可能引起全身性蕁麻疹、寒顫；極少數特異體質患者會發生喉頭水腫、血壓降低、心肺衰竭、休克。以上這些患者務必在接受檢查前，充分與醫師討論。

#### 可能替代方案：

醫師安排檢查或治療前均經過慎重的決策，若對於醫療處置有任何疑問，請先與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。依病況不同因人而異。病人可按個人之風險承受程度及其他個人因素，你可以決定接受或不接受各建議之選項。

## CONTACT

醫院地址： 新竹市立馬偕兒童醫院 新竹市東區建功二路 28 號  
醫療諮詢服務： 放射線科 (03)5719999 轉 2236

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論