



排尿中膀胱尿道攝影檢查

衛教資訊

檢查前：

1. 因受檢時幼童容易躁動，故需 2 位家屬(成人、未懷孕、能溝通者)協助檢查順利完成。
2. 請六歲以下受檢者禁食 3 小時為避免幼童哭鬧嘔吐導致嗆到，造成吸入性肺炎的危險。
3. 受檢者請穿著無金屬釦子的兩件式衣褲。請為幼童多攜帶一套衣服、紙尿褲及奶粉備用。
4. 糖尿病藥物絕不可服用，以免血糖過低。
5. 其他如高血壓、心臟病等慢性病藥物請按原主治醫師處方服用。

檢查過程說明：

檢查時會先請受檢者平躺於檢查台上，若為兒童會請兩位未懷孕家屬穿著鉛衣後幫忙，一人固定受檢者雙手及上半身，另一家屬固定雙腿及雙膝。醫護人員先用優碘消毒，給予少量尿道局部麻醉劑，然後置放一細小柔軟導尿管經由尿道置入膀胱處。此時幼童會哭鬧及有尿意，請務必安撫並固定好幼童。醫師會在 X 光的透視監視下，經由導尿管注入對比劑，並拍攝膀胱脹尿時的相關影像。然後再徐徐拔出導尿管，拍攝動態解尿時輸尿管、膀胱、尿道的相關解剖位置。

可能產生的反應及併發症：

1. 約 6% 之發生率產生細菌感染。極少數受檢者會發生膀胱破裂。
2. 極少數受檢者曾發生導尿後 6 小時仍不肯解尿情形，請立即掛急診並告知急診醫師曾執行此項檢查。
3. 導尿時可能發生創傷造成微量血尿，多為受檢者於插管時移動所致，此種情形如果連續出現 2 天以上，請即再掛門診。

可能替代方案：

醫師安排檢查或治療前均經過慎重的決策，若對於醫療處置有任何疑問，請先與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。依病況不同因人而異。病人可按個人之風險承受程度及其他個人因素，你可以決定接受或不接受各建議之選項。

CONTACT

醫院地址： 新竹市立馬偕兒童醫院 新竹市東區建功二路 28 號

醫療諮詢服務： 放射線科 (03)5719999 轉 2236

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論