



## 電腦斷層掃描攝影檢查

### 衛教資訊

#### 檢查過程說明：

此項檢查為 X 光照射後經由電腦處理影像，進一步將人體組織及器官以斷面顯示。檢查內容常需輔以“靜脈注射非離子對比劑”，作進一步診斷內容評估。檢查過程約需 10~15 分鐘。成人受檢需禁食 6 小時、幼童禁食 4 小時而新生兒則是前一餐禁食。

- ☆ 檢查前禁食時絕不可服用糖尿病藥物，以免血糖過低。
- ☆ 受檢者患有腎臟疾病或存在可能的腎功能不良並且同時使用降血糖藥物 metformin 時，施打顯影劑可能會造成乳酸中毒的危險。若您正在使用 metformin，請事前提醒檢查人員。
- ☆ 其他如高血壓、心臟病慢性病等慢性藥物請按原主治醫師處方服用。

#### “靜脈注射對比劑”可能產生的反應及併發症：

- ☆ 少數人可能產生各種不同程度反應，如：溫熱感覺、噁心、嘔吐、頭暈。
- ☆ 對於過敏體質者，可能引起較嚴重反應。如：蕁麻疹、寒顫、胸悶、呼吸困難。
- ☆ 少數特異體質者，可能發生罕見休克、猝死。(發生率約十萬分之一)
- ☆ 對比劑滲漏到血管外肌肉及皮下組織可能造成肌肉及皮膚壞死，嚴重時需外科清創補皮。

#### 可能替代方案：

醫師安排檢查或治療前均經過慎重的決策，若對於醫療處置有任何疑問，請先與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。依病況不同因人而異。病人可按個人之風險承受程度及其他個人因素，你可以決定接受或不接受各建議之選項。

## CONTACT

醫院地址：新竹市立馬偕兒童醫院 新竹市東區建功二路 28 號

醫療諮詢服務：放射線科 (03)5719999 轉 2236

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論