



靜脈攝影檢查及相關處置

衛教資訊

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

☆禁食 4 小時，包括水分

☆糖尿病藥物絕不可服用，以免血糖過低

☆其他如高血壓、心臟病慢性病等慢性病藥物請按原主治醫師處方服用

檢查過程說明：

為診斷靜脈疾病或靜脈疾病的治療例如狹窄靜脈做靜脈擴張治療、靜脈血栓症做藥物灌注溶解血栓、或置放下腔靜脈過濾器預防肺動脈栓塞（靜脈血栓術溶解術、靜脈血管擴張術、下腔靜脈過濾器置放術）

靜脈攝影術是指將導管置入人體靜脈血管內，一般四肢靜脈攝影後手背、手腕、上臂、足背、下腿或鼠蹊部靜脈將頭皮針或塑膠管針置入靜脈，接著注射對比劑照像，來診斷靜脈疾病或進一步治療靜脈相關疾病的一種診療技術。在注射對比劑進行攝影時，會有「灼熱感」。這是正常現象。需進一步做相關治療處置時會使用特殊的導管，金屬導線，氣球擴張導管，及注入要灌注的藥劑。檢查完成後醫師會將頭皮針或塑膠管針拔出，並以手指壓住傷口止血並用膠帶黏貼。

可能發生的併發症：

打針處對比劑外漏造成局部組織腫脹甚至皮膚壞死需做植皮手術、檢查的靜脈發生靜脈炎、靜脈血栓形成，肺動脈栓塞，和對比劑之過敏反應。

對比劑之過敏反應：

1. 輕微之過敏反應包括：嘔吐、頭暈、打噴嚏、或鼻塞，較嚴重反應如丘疹、蕁麻疹、寒顫、胸悶、呼吸困難等症狀。
2. 對具特異體質者：可能會發生罕見之喉嚨水腫、氣喘、血壓異常降低、心臟衰竭、休克及猝死（死亡機率約 4 萬至 10 萬分之一）。
3. 腎功能不良者（如慢性糖尿病患者）：發生腎衰竭的機率更高。
4. 若曾因注射含碘對比劑而引起上述不良反應或本身腎功能不佳者，請告知。

檢查時請親友陪同前來以方便照顧且檢查後回病房平躺臥床休息亦須有人在旁照顧。

