

新竹馬偕紀念醫院

地址：
30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：
03-5166868 · 03-6119595

電子郵件：
hcservice@mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-5745098
週一 ~ 週五上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一 ~ 週五 上午 8:00~17:00
週六 上午 8:00~12:00

黴菌感染時的注意事項

修訂: 2018/10/15

護理部 門診



新竹馬偕紀念醫院

Hsinchu MacKay Memorial Hospital

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有 · 並保留一切權利

- 一、 症狀：陰部脫皮、搔癢、發炎、燒灼感、分泌物惡臭，且有白色乾酪狀或凝乳狀分泌物。壓力、睡眠、免疫力不足，易增加感染率。
- 二、 感染此症時，陰部、陰道及肛門一帶地區需同時治療。
- 三、 局部擦藥膏和每天晚上放塞劑一顆於陰道內，治療三天至二週。
- 四、 治療期間，請性伴侶使用保險套或是暫時避免性交。
- 五、 排尿後小心地自前（尿道）向後（肛門）擦拭，陰道保持清潔。
- 六、 穿棉質內褲，勿穿太緊衣褲(如牛仔褲)；並注意個人衛生。
- 七、 避免使用可能會刺激陰道的粉劑或噴霧劑，避免陰道灌洗。
- 八、 必須徹底地治療，因為症狀消失並不意味痊癒；如有糖尿病或其他免疫力降低情況，應先治好。
- 九、 如長期治療未癒，或經常復發，不便使用塞劑者，可考慮口服藥。

~如需轉載本篇文章或有任何疑問，請洽 新竹馬偕紀念醫院 門診~