

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

小兒外科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

胚胎時期腹腔和胸腔之間的開口沒有關閉，腹腔器官在胸腔內而壓迫到同側的肺，使得肺部無法在胚胎期正常生長。百分之七十五的橫膈膜疝氣發生在左邊。

症狀:

1. 漸進性呼吸窘迫
2. 胸部鼓起，腹部下凹呈舟狀
3. 血氧過低、酸中毒的情形
4. 大小孩會以嘔吐、無法進食來表現

診斷:

- 胸部 X 光檢查 – 胸腔內有腸氣

治療:

- 開腹手術修補橫膈膜缺口。

預後:

1. 視是否合併其他先天異常(e.g 心臟) 及 術後患側肺部發育而定。
2. 合併有肺動脈高壓的先天性橫膈膜缺損者死亡率極高。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。