

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865  
週一～週五 上午 9:00~12:00  
下午 14:00~17:00  
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866  
週一～週五上午 8:00~17:00  
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/22

美容科



新竹馬偕紀念醫院

Mackay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

一. 手術介紹

- 1、眼皮手術是臺灣最常見的美容手術，其手術目的可歸納如下
  - (1) 重新定位眼瞼板，美化眼皮外觀
  - (2) 切除多餘皮膚，改善眼皮浮腫
  - (3) 去除眼袋，矯正眼皮老化
  - (4) 更改眼皮位置，治療眼皮下垂，避免視線受阻
- 2、因眼皮手術的範圍有限，有時須伴隨其他手術的施行才能達到整體美化：假如伴隨有眉毛下垂或抬頭紋，則可施行前額內視鏡手術；假如伴隨有黑斑細紋，則可施行雷射或果酸換膚；假如伴隨有眼尾紋，則可施行肉毒桿菌類毒素注射
- 3、眼皮手術可於局部麻醉或全身麻醉下施行，其決定依據於您的身體狀況及可能伴隨的手術方式

## 二. 手術前注意事項

- 1、手術如需全身麻醉,請於前一天午夜後禁食(包括開水飲料)
- 2、手術兩週前禁煙,且三天前禁用阿斯匹靈等止痛藥,以減少傷口瘀腫流血
- 3、事先準備冰敷物品,手術後在恢復室將立即冰敷,並於術後三天繼續,以減輕腫脹
- 4、手術當天請勿獨自開車或騎車,以維自身安全
- 5、請於術前充分告知醫師您的過往病史及家族病史,特別是以下疾病:
  - (1) 乾眼症
  - (2) 顏面神經麻痺
  - (3) 甲狀腺機能亢進
  - (4) 血友病
  - (5) 眼睛或眼皮外傷

## 三. 手術可能發生的併發症

- 1、瘀腫:大部份瘀腫可於六至八週後消除,有效的冰敷可減清症狀
- 2、出血:並不常見,大部份可經由壓迫止住,如壓迫治療仍無法有效止血,重新進入手術室是必要的
- 3、感染:雖不常發生,但萬一有術後感染,則須抗生素或進一步清創治療
- 4、麻醉反應:少數病患會有麻醉藥過度反應,可能須中止手術的進行,嚴重者會有短暫心律不整,甚至有死亡的危險
- 5、過敏:部份病患會對縫線過敏,嚴重者需重新進入手術室取出
- 6、角膜傷害:術後如有眼球疼痛症狀,可能為角膜受傷,須配合眼科醫師做治療
- 7、角膜腫脹:大部份角膜腫脹因眼球乾燥造成,可以藥物治療,少數需進一步手術矯正
- 8、眼皮閉合不全:大部份因腫脹造成,少數為永久性眼皮閉合不全者應接受進一步治療或手術
- 9、眼皮下垂:可能因組織沾粘或縫線脫離等原因造成,少數為肌肉或筋膜受傷造成,可能須進入手術室治療
- 10、眼瞼外翻:大部份眼瞼外翻可於六至八週後消除,如為永久性眼瞼外翻者應接受進一步治療或手術
- 11、不對稱外觀:大部份在腫脹消失後消除,如為明顯不對稱,需再手術矯正
- 12、眼皮壞死:文獻記錄上,至今僅有一個案報告為全層皮膚壞死,須接受進一步重建手術
- 13、複視:短期複視可能因瘀血腫脹造成,永久性複視則好發於第二次眼皮手術,一但發生,則應接受進一步治療或手術
- 14、失明:文獻記載發生機率為0.04%,大多因眼壓過高或眼球出血造成,確切發生原因至今不明
- 15、其他未能預估之併發症或後遺症

➤ 新竹馬偕紀念醫院,關心您的健康。