

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

修訂: 2014/04/17

泌尿科

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一~週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一~週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

定義：

人體的膀胱主要的功能是貯存和排出尿液,這兩項功能的完成都必須依靠各種神經的控制和協調。當神經功能受到傷害時,膀胱的功能也隨之受到影響,並使膀胱本身產生各種病理變化,這種情況稱為神經性膀胱。

症狀：

痙攣性的神經性膀胱：是因為腰椎以上的中樞神經受到損傷，這樣病患會有不自主排尿的症狀，由於膀胱是處於一種痙攣性收縮的狀態，所以膀胱的容量常常是小於 300ml，而膀胱內的壓力也會比較高。

鬆弛性的神經性膀胱：是因為薦椎以下的中樞神經或周邊神經受到損傷，使得膀胱肌肉失去收縮力，整個膀胱脹得很大,積了很多尿液後才会有部分尿液由尿道溢流出來。

大部分神經性膀胱的病患主要是因中樞神經對膀胱功能的控制變差，使病患會有頻尿、夜尿、尿急、排尿困難、排尿中斷和餘尿增加的情形。

原因：

事實上,幾乎所有神經系統的病變都可以影響膀胱功能。如中風、巴金森症、多發性硬化症、糖尿病、脊髓膨出、脊髓外傷或手術、骨盆腔的外傷或手術等,都可能影響膀胱功能。

不良的排尿習慣、器官老化、發炎或焦慮等因素所造成的神經機能退化,都會影響膀胱功能,造成了神經性膀胱。

診斷：

病患詳細的病史和身體檢查 尿流動力學檢查,如膀胱功能測量,尿流速測定,尿道壓力檢查以及肌電圖檢查。放射線 超音波 內視鏡

治療：

藥物治療 膀胱排尿反射訓練 導尿—留置導尿或間歇性自我導尿·膀胱造瘻術 手術—如尿道括約肌切開術、脊髓神經根切斷術或尿液分流術。

併發症：

尿失禁·反覆的膀胱、腎臟的感染和產生結石,會使腎臟水腫,腎臟機能喪失,造成尿毒症,或是引發嚴重的尿路感染造成敗血症。

日常保健：

充份的飲水,多吃青菜水果等富含維他命 C 的食物 尿袋應該放低,以免尿袋中的尿液回流。尿管和尿袋一個月換一次,但如果沉澱物太多,就該適時更換。注意尿路的通暢,和局部的清潔,以避免發生嚴重的感染。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。