

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

修訂: 2014/04/24

大腸直腸外科

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

肛門膿瘍


肛門線受直腸內細菌感染，發炎腫脹即造成「膿瘍」。發炎未經治療，膿瘍可能往上破入直腸或往外破出肛門周圍皮下而造成「瘻管」。肛門膿瘍較常發生於男性。其致病因可因肛裂，痔瘡脫垂，或外傷等原因造成感染。以其延伸的範圍及位置不同，而造成各種不同型態的膿瘍，臨床表現包括發燒，肛門或直腸部分周圍腫塊疼痛，紅腫。

治療方法：

1. 一般以手術切開清除瘻管及壞死組織來治療
2. 口服抗生素或局部消炎藥膏塗抹
3. 部分病人會先經外科切開引流治療後，需再進行瘻管切

除術

- 保守治療一般無效，外科手術才能根治病源
- 找到肛門周圍瘻管的外部開口，然後將探針從外開口延著管道找出瘻管的內部開口
- 將整個瘻管管道切開
- 除去感染發炎的肛門腺體(anal gland)並刮除壞死組織，清除持續性發炎的瘻管
- 傷口不縫合，讓內部的發炎的積液，膿可以引流出來
- 每天以溫水坐浴保持傷口清潔，塗上藥膏，使傷口從深處慢慢癒合，一般需要數週才會完全癒合



肛門瘻管

肛門瘻管定義為一管道與直腸或肛門相通，可以說是肛門膿瘍的慢性期，此一管道因其深入侵犯位置的不同，而可分類成各種不同型態的肛門瘻管。

治療方法，一般以外科手術切除或切開，方可根治，然對於高位性或是複雜性的肛門直腸瘻管，除作瘻管切除手術外，有些病患甚至需施予暫時性的人工肛門繞道手術，以求肛門瘻管的徹底根治。

肛門瘻管雖然是屬於良性疾患，但不可以放任不管，有些研究發現，長期不處理的病患，也是有轉變成惡性腫瘤的可能性，也可能因為未處理而使得瘻管不斷增生、延伸，最後可能嚴重損傷括約肌，或穿透到腸、膀胱或其他臟器等，同樣會產生嚴重的後果。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。