

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

腹股溝疝氣

修訂: 2014/04/24

小兒外科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

症狀:

疝氣通常可摸到腹股溝有腫塊，有時甚至延伸到陰囊或陰唇。輕度的疝氣只有在小孩子哭或者用力時才會出現。小孩子疝氣通常不會痛，但如有疝氣嵌頓時則會痛。一旦發現疝氣應儘快安排門診手術。因為愈小的小孩，發生嵌頓的機會愈大，而嵌頓性疝氣有時需緊急手術。

診斷:

身體檢查，醫師觸診

治療:

一旦發現疝氣應儘快安排門診手術。因為愈小的小孩，發生嵌頓的機會愈大，而嵌頓性疝氣有時需緊急手術。如果發生嵌頓性疝氣首先要分別有無腸子壞死，如果沒有壞死，可嘗試徒手復位。

預後:

復發率極低



► 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。