

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865  
週一～週五 上午 9:00~12:00  
下午 14:00~17:00  
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866  
週一～週五上午 8:00~17:00  
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/22

美容科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有 · 並保留一切權利

一、手術介紹

1. 雷射手術是利用不同波長的集中光束選擇性的燒毀目標組織,例如血管瘤的血管組織,色素斑的黑色素細胞等,因此術後往往有類似淺度燒燙傷的反應
2. 雷射治療的目標組織常位於皮膚較深部位,為了減少周圍組織的傷害,往往須 3-4 次的雷射治療才能有效去除病灶

二、手術前注意事項

1. 雷射手術常使用塗抹式的局部麻醉藥,請於術前 1-2 小時到醫院塗抹
2. 手術兩週前禁煙,且三天前禁用阿斯匹靈等止痛藥,以減少傷口瘀腫流血
3. 手術當天請勿上妝,塗抹麻醉藥前請先清潔該部位皮膚
4. 術後照顧極為重要,請務必依照醫師指示,以避免復發

三、手術可能的併發症

1. 疼痛: 雖然有局部麻醉,但部份患者仍會有蚊蟲叮咬的感覺
2. 瘀腫: 第二至三天最嚴重,經適當照顧會逐漸消退
3. 水泡: 可能在二至三天發生,經適當照顧後,約兩週後逐漸消退
4. 色素沉著: 易見於紫外線照射部位,一般約六個月後消失,但有少數病患會有永久性變化無法自然去除
5. 白斑: 易見於重複治療部位,一般約六個月後消失,但有少數病患會有永久性變化無法自然去除
6. 傷口感染: 有 1-5%病患會有傷口感染—紅腫熱痛,須持續以藥物甚至手術治療
7. 疤痕增生: 易見於重複治療及傷口感染部位,無法自然去除,須以壓迫治療等方法降低其增生
8. 變色反應: 因刺青所用色料不同,其粒子遇熱可能會發生色彩改變的狀況
9. 色素存留: 因色料存留深度不同,雷射治療後可能仍然存有剩餘色斑,即使經過多次治療亦無法完全根除

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。